Умногих вдомах еще остался ртутный градусник— онпоказывает гораздо точнее иникогда неврет. Все бы хорошо, только боязнь разбить термометр преследует, стоить только взять его в руки. Однако ничего вэтом страшного нет, важно лишь соблюдать несколько правил.

Чего нивкоем случае нельзя делать, если градусник разбился, ачто обязательно нужно.

## Что делать строго запрещено.

- 1. Оставлять детей и животных в комнате. Ртуть легко прилипает к подошвам или шерсти, поэтому не стоит рисковать.
- 2. Собирать ртуть пылесосом. Во-первых, горячий воздух ускорит ее испарение. Во-вторых, частицы ртути осядут на внутренностях пылесоса, он превратится врассадник токсичного вещества.
- 3. Заметать ртуть. Жесткая щетина веника или щетки раздробит ртуть на маленькие, едва заметные капли.
- 4. Использовать тряпку. Она разотрет ртуть пополу, увеличив площадь поражения.
- 5. Смывать вканализацию выбрасывать вмусоропровод. Ртуть недойдет до станции очистки, аосядет натрубах, отравляя всех окружающих. Тоже самое произойдет, если выкинуть еевмусоропровод или напомойку.
  - 6. Устраивать сквозняк. Испарения ртути разлетятся повсей жилплощади.
- 7. Пытаться спасти одежду, накоторую попала ртуть. Металл попадет вканализацию или барабан стиральной машины. Сдайте одежду наутилизацию вместе ссобранной ртутью.

## Что делать, если разбился градусник.

Самоеглавное правило— непаниковать. Разбитый градусник— это нефатальный исход, ипереезжать непридется. Официально процесс сбора ртути называетсядемеркуризация— все серьезно, нововсе нестрашно.

- 1. Удалить изкомнатывсех постороннихивыключить все, чтоповышает температуру воздуха. Можно открыть окно, но важно следить, чтобы нивкоем случае невозник сквозняк.
- 2. Переодеться ввещи, которые будет нежалко выбросить. Отдать предпочтение материалам, которые ничего невпитывают. Наруки надетьрезиновые перчатки, налицо—тканевую повязку, наноги—бахилы.
- 3. Приготовить емкость сраствором хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» (израсчета 1л «Белизны» на5л воды) либо раствормарганцовки (1г на8л воды), если увас имеется возможность еедостать.
- 4. Взятьмокрую кисточку, шприц стонкой иглой, плотную картонку, лейкопластырьиемкость сводой или раствором изпункта 3с крышкой. Средние ималенькие шарики втянуть вшприц, большие закатать кисточкой накартонку ивылить вбанку. Самые маленькие убрать пластырем, аккуратно наклеивая ихнаповерхность. Сбор капель— отпериферии кцентру помещения.
- 5. Взятьфонарик— ртуть хорошо отсвечивает. Найти сего помощью оставшиеся шарики иубратьих. Изщелей лучше всего выкатить

ихметаллической иголкой. Плинтус сорвать итакже упаковать вплотный пакет, чтобы затем утилизировать.

- 6. Все вещи, которые контактировали сметаллом,собрать впакет иплотно завязать. Банку ссобранной ртутью иостатками градусника плотно закупорить.
- 7. Протереть все контактировавшие сртутью поверхности раствором «Белизны» ивыдержать 15 минут, затем смыть чистой водой. Для более полной демеркуризации после можно обработать ихраствором перманганата калия (если есть).
- 8. Позвонить вМЧСпотелефону 112испросить про ближайшую возможность утилизации ртути.
- 9. Тщательно вымыться, прополоскать несколько раз ротовую полостьсодовым растворомипринять несколько таблетокактивированного углядля дезинфекции. Комнату, где разбили градусник, закрыть отпосещений нанеделю, оставив открытым одно окно. Регулярно дезинфицировать вней пол раствором «Белизны». Ипить больше жидкости.

Если ртуть попала натканевую поверхность или туда, где собрать ееневозможно, товтаких случаях без помощи специалистов будет необойтись.

Чем опасна ртуть?

Ртуть относится к1-му классу опасности, представляя собой кумулятивныйяд, иэто единственный металл, который при комнатной температуре находится вжидкой форме. Наоткрытом воздухе ртуть начинает испаряться, что делает градусник довольно опасной вещью.

Симптомы отравления ртутью:

- •металлический привкус ворту;
- •общая слабость;
- •отсутствие аппетита;
- •головная боль идискомфорт при глотании;
- •тошнота ирвота.

Вотсутствие оказания помощи пострадавшему симптомы усугубляются:

- •кровоточивость десен;
- •боли вживоте;
- •жидкий стул сослизистыми икровяными вкраплениями;
- •резкое повышение температуры тела, порой до40С.

Такие признаки— повод для немедленной госпитализации. Особенно вреден контакт сртутью детям ибеременным женщинам, так как это может привести кнепоправимым нарушениям.

Первая помощь, которую можно оказать при отравлении ртутью, — это прием абсорбентов ибольшого количества обычной воды.



Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу